

D38.美容皮膚科学 サプリメント・プロテイン V1.0

美容や健康への意識の高まりとともに、「体の内側からの美容（Beauty from within）」というコンセプトが世界的に広がり、サプリメント市場が急成長しています。本文書では、美容医療に関心のある医師向けに、エビデンスに基づいたサプリメント及びプロテイン製品の活用法を網羅的かつ詳細に解説します。



一般社団法人再生医療ネットワーク

<https://rmnw.jp>

著:再生医療ネットワーク代表理事 松原充久 監修:ヒメクリニック 武藤ひめ

使用している写真はAIにより作成されたものです。

精密に作成はしていますが、誇張された部分もあり、症状との比較には使用しないでください。

市場動向と美容サプリメントの位置づけ

8,860

億円

2022年度 日本の健康食品市場規模

68%

市場拡大

美容・健康目的サプリメント市場の成長

40%

利用率

美容医療併用でのサプリメント使用

日本の健康食品市場は2022年度に約8,860億円に達し、その中で美容・健康目的のサプリメントが大きな割合を占め、市場は大幅に拡大しています。美容医療の現場でも、シミ・しわ・脱毛などの症状改善やアンチエイジング目的で各種サプリメントを併用するケースが増加しており、利用率は約40%に上ります。

⚠ 重要：エビデンスに基づく選択

しかし一方で、サプリメントは医薬品とは異なりエビデンス（科学的根拠）が限定的なものも多く、玉石混交の状況です。医師としては、作用機序や有効性、安全性について最新の知見を把握し、エビデンスに基づき患者に適切な提案を行うことが極めて重要です。



美容医療におけるサプリメント活用の基本原則

01

エビデンスレベルの確認と優先

各サブリの有効性には差があり、ランダム化比較試験（RCT）やメタアナリシスなど、科学的根拠の質を評価します。特に高レベルのエビデンスに基づく成分（例：ビタミンC、コエンザイムQ10）を優先し、研究段階のものは慎重に推奨度を調整します。

02

安全性の徹底的な担保

国内外の安全情報やFDA警告等に常に目を配り、**薬物相互作用データベース**を用いて既服用薬との併用禁忌を確認します。特に複数のサブリを服用する患者では、定期的な**肝機能・腎機能検査**も考慮し、過剰摂取や相互作用による副作用を未然に防ぎます。

03

患者ごとのパーソナルな計画

年齢、性別、既往症、アレルギー、生活習慣、そして**詳細な問診や検査結果**に基づき、個々の患者に最適なサプリメント計画を立案します。例えば、乾燥肌にはセラミド、シミには抗酸化成分など、具体的な症状や目標に合わせたテーラーメイドな提案を行います。

04

生活習慣改善との相乗効果

サプリメントはあくまで**補助的な役割**であり、単独では効果が限定的であることを患者に明確に伝えます。十分な睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動など、基本的な生活習慣の改善と組み合わせることで、サプリメントの効果を最大化し、長期的な健康と美容をサポートします。



美白目的のサプリメント： 概要

肌の美白（色素沈着の改善やくすみの軽減）は、特にアジアにおいて需要の高い美容目的です。

主要な内服成分

- トラネキサム酸（TXA）
- ビタミンC
- L-システイン
- グルタチオン

これらの成分は、単独または組み合わせて使用され、外用治療との併用でより高い効果が期待されます。

抗酸化植物成分

- 松樹皮エキス（ピクノジェノール）
- ブドウ種子由来OPC
- カロテノイド（アスタキサンチンなど）

これらも美白効果を謳って利用されています。



トラネミキン酸（TXA）の作用機序と有効性

作用機序と推奨用量

トラネミキン酸（TXA）は、本来止血目的の医薬品ですが、日本では1970年代に肝斑（メラasma）への有効性が偶然発見されました。その作用機序は、抗プラスミン作用によりメラニン産生を間接的に抑制することにあります。

典型的な処方は、**1回250 mgを1日3回（計750 mg/日）**で、約**8～12週間**の継続により多くの患者で肝斑の色調改善が認められます。韓国や中国でも同様の無作為化比較試験（RCT）で有効性が確認されています。

推奨用量

750 mg/日（250 mg × 3回）

治療期間

8～12週間

効果判定

3ヶ月後

維持療法

週数回の継続可能

⊗ 重要な禁忌事項

TXAは血栓傾向のある患者では禁忌となるため注意が必要です。また、妊娠中の安全性は確立していません。



ビタミンCとL-システインの併用療法

ビタミンCとL-システインは、シミや肝斑の改善に効果的な成分です。ビタミンCはチロシナーゼ酵素を直接阻害し、コラーゲン合成を促進する抗酸化ビタミンであり、L-システインは黒色メラニンの生成を抑制し、フェオメラニンの産生を促進します。

● ビタミンC

推奨用量: 1日1000～2000 mg

- チロシナーゼ阻害作用
- コラーゲン合成促進作用
- 強力な抗酸化作用

● L-システイン

推奨用量: 1日240 mg程度

- フェオメラニン産生促進
- 黒色メラニン生成抑制
- 抗酸化作用


● 市販製剤例

ハイチオールCホワイティア

- ビタミンC 2000 mg
- L-システイン 240 mg
- 1日分配合

このビタミンCとL-システインの併用療法は、日本独自の伝統的アプローチとして定着しており、市販薬やクリニックで広く採用されています。安全性は高いとされていますが、特にビタミンCの2g/日以上での長期摂取では、まれに消化器症状や腎結石のリスクが指摘されています。過剰摂取分は尿中に排泄されます。

- ☐ **患者様への指導:** 長期服用を検討される際は、医師または薬剤師にご相談ください。特に、腎機能に不安のある方や消化器症状が出やすい方は注意が必要です。



グルタチオンの美白効果と 注意点

グルタチオンは強力な抗酸化物質であり、メラニン合成の過程で黒色メラニンへの転換を抑える作用が示唆されています。東南アジアでは「飲む美白剤」として注目を集めました。

経口摂取の可能性

タイで行われたRCT（無作為化比較試験）では、**500 mg/日を4週間経口摂取**した被験者で、肌の明るさが有意に向上したと報告されています。

※症例数が少なく観察期間も短いため、さらなる研究が必要です。

⚠ 米国FDAによる警告

美容目的のグルタチオン点滴は、肝機能障害や腎障害などの**重篤な副作用リスク**が報告されており、米国FDA（食品医薬品局）が使用中止を警告しています。全身性美白効果の科学的根拠も乏しいとされています。



"CAUTION"

その他の美白系サプリメント成分



ビタミンE（トコフェロール）

抗酸化作用により活性酸素を除去し、肌の酸化ストレスを軽減します。ビタミンCとの併用で相乗的な美白効果が期待されます。ただし、過剰摂取には注意が必要で、**耐容上限は成人で800 mg α-TE/日**とされています。脂溶性のため、食事と共に摂取すると吸収率が高まります。



ピクノジェノール（フランス海岸松樹皮抽出物）

強力な抗酸化作用を持ち、メラニン生成に関わる酵素（チロシナーゼ）の活性を抑制することで、シミ・そばかすの予防に寄与するとされています。また、UVダメージから肌を保護し、コラーゲンやエラスチンの生成をサポートする効果も報告されています。推奨摂取量は**40～100 mg/日**です。



ブドウ種子OPC（オリゴメリックプロアントシアニン）

ブドウ種子に含まれるポリフェノールの一種で、ビタミンCの20倍、ビタミンEの50倍とも言われる強力な抗酸化力を持つとされています。血管を保護し、血行を促進することで、肌の新陳代謝を活性化し、ターンオーバーを正常化することで美肌効果が期待されます。摂取目安は**100～300 mg/日**です。



アスタキサンチン（ヘマトコッカス藻色素）

鮭やエビなどに含まれる赤い色素で、優れた抗酸化力を持つことから「飲む日焼け止め」としても注目されています。臨床研究では、**1日4～6 mgの継続摂取**により、肌の乾燥、キメ、弾力、細かいシワの改善を示した報告があります。メラニン生成抑制作用も示唆されています。



美白サプリメントの臨床応用ガイド

美白サプリメントは、**肝斑**や**色素沈着**に悩む患者に対して、外用ハイドロキノンやレーザー治療と併用して提案されることが多いです。以下に代表的な活用例を示します。

初期評価（0週）

血液検査（肝機能・凝固系チェック）、写真撮影による色調評価、患者背景（喫煙・既往歴）確認

1

2

治療開始（1-4週）

トラネキサム酸
750mg/日開始、ビタミンC + L-システイン併用、厳重な紫外線防御指導、外用治療併用

中間評価（8週）

効果判定、副作用チェック、必要に応じて用量調整、患者満足度評価


3

4

最終評価（12週）

治療効果の総合判定、メンテナンス療法の検討、長期フォローアップ計画立案

肝斑の患者には、**厳重な紫外線防御**の指導に加え、**トラネキサム酸 750 mg/日**を8～12週間、**ビタミンC 1000 mg + L-システイン 240 mg**の併用が標準的なアプローチです。治療効果は数週間で現れ始め、3ヶ月程度で色調改善が期待できます。



エイジングケア（抗加齢） サプリメント：概要

アンチエイジング目的のサプリメントは、肌老化の予防や全身の老化現象の緩和を狙って使用されます。その作用メカニズムは多岐にわたります。

抗酸化作用

酸化ストレスを軽減し、細胞のダメージを防ぎます。

細胞エネルギー代謝改善

細胞の活性を高め、新陳代謝を促進します。

糖化抑制

糖化による肌の弾力低下や黄ぐすみを防ぎます。

ホルモン様作用・細胞賦活

細胞の再生や機能をサポートし、若々しさを維持します。

美容医療において、これらサプリメントは治療効果の向上や維持、予防的ケアの観点から重要な位置を占めています。患者の年齢や肌状態、ライフスタイルに応じた適切な選択が求められます。




コラーゲンペプチドの科学的エビデンス

作用機序と臨床データ


日本で広く知られている美容サプリメントの一つにコラーゲン配合製品があります。経口摂取したコラーゲンが肌に作用するメカニズムについて議論がありましたが、近年のプラセボ対照試験において、肌の水分量や弾力性の改善が複数報告されています。

ある研究では、コラーゲンペプチドを**5 g/日**、**8週間**摂取した結果、皮膚からの水分蒸散量（TEWL）が有意に低下しました。これは、コラーゲンペプチドに豊富に含まれるヒドロキシプロリンやグリシンが、皮膚真皮におけるコラーゲン産生を促進する可能性を示唆しています。




推奨用量

1日あたりの摂取目安量



効果判定期間

臨床試験で効果が確認され始める目安



① 患者指導のポイント

コラーゲンペプチドの効果を最大限に引き出すためには、毎日継続して摂取することが重要です。効果実感までには通常2ヶ月程度の期間が必要となることを説明し、長期的な視点での使用を推奨しましょう。

ヒアルロン酸・セラミドの 経口摂取効果

ヒアルロン酸とセラミドは、いずれも皮膚の保湿とバリア機能維持に重要な成分です。

ヒアルロン酸




経口摂取されたヒアルロン酸は消化管で一部が低分子フラグメントとして吸収され、全身へ作用し得ると示唆されています。**120 mg/日の摂取で皮膚水分量の上昇**が報告されており、保湿効果を発揮する可能性があります。

セラミド



主に植物由来のグルコシルセラミドは、経口摂取により角質層水分量を高め、皮膚バリア機能をサポートします。**1日数mg程度の継続的な摂取**が推奨されています。

日本ではヒアルロン酸やセラミド含有の機能性表示食品が人気を集め、市場を牽引しています。肌の乾燥や敏感肌に悩む方には、従来のスキンケアに加えて、これら経口保湿成分（ヒアルロン酸・セラミド）を補給する「内外両面からのアプローチ」が、より効果的な改善策として近年注目されています。



プラセンタ（胎盤エキス） の美容効果

ヒト胎盤由来の医療用注射薬（ラエンネック®, メルスモン®）が更年期障害や肝機能改善に用いられてきましたが、美容目的でも内服・注射が行われています。

市販の美容プラセンタ

近年ではブタ由来プラセンタエキスを含むドリンクやカプセルが「美容プラセンタ」として市販され、アンチエイジング用途で人気です。

① **推奨量の目安:** 豚プラセンタエキス純末換算で1日400mg程度が多く用いられています。

期待される効果と現状

胎盤にはアミノ酸、ビタミン、ミネラル、成長因子様物質が豊富に含まれるため、**美白・抗老化効果**が期待されます。

ただしヒトでの確実なエビデンスは限定的であり、その有効性については専門家間でも賛否が分かれています。

日本皮膚科学会の肝斑治療ガイドラインでは、「試みることもできる治療」として中等度の推奨に留まっています。



ビタミン類・抗酸化物質の総合的活用

老化の一因である酸化ストレスを軽減するため、**ビタミンC**や**ビタミンE**、**コエンザイムQ10 (CoQ10)**、**α-リポ酸**などが広く利用されています。これらは単独よりも互いに補完し、相乗的に作用することが知られています。

● ビタミンC・E

これらは強力な抗酸化物質で、協調して作用することでUV曝露による光老化（シミ・シワ）の予防効果が期待されます。特に高用量内服の場合、日焼け後の炎症や色素沈着を軽減したとの報告もあります。

● コエンザイムQ10 (CoQ10)

細胞のエネルギー産生を助ける補酵素であり、抗酸化作用も持ちます。ある研究では、**1日100mgの摂取を12週間継続**することで、**シワの深さが有意に改善された**という報告があります。

● レスベラトロール

ブドウやベリー類に多く含まれるポリフェノールの一種です。特に**サーチュイン遺伝子（長寿遺伝子）の活性化**に寄与することが動物実験で示されており、抗老化作用への期待が高まっています。推奨摂取量は**1日20～50mg**とされています。

● α-リポ酸

水溶性・脂溶性の両方の性質を持つユニークな抗酸化物質で、体内の様々な場所で作用します。他の抗酸化物質（ビタミンC, E, CoQ10, グルタチオンなど）の働きを助け、再活性化する役割も担います。

① 患者指導のポイント

これらのサプリメントは食品からの摂取が理想ですが、不足分を補うために利用されます。過剰摂取は避けるべきであり、特に疾患をお持ちの方や薬を服用中の方は、摂取前に必ず医師または薬剤師にご相談ください。



ニコチンアミドモノヌクレオチド（NMN）の最新エビデンス

近年、「抗老化の鍵」として世界的に注目されている成分です。NMNは体内で補酵素NAD+の前駆物質となり、加齢とともに低下するNAD+レベルを回復させることで、細胞のエネルギー代謝やDNA修復機構を活性化すると期待されています。

01

動物実験での効果

マウス実験において、老化に伴う様々な臓器機能低下（例：インスリン感受性、脂質代謝）を改善し、サーチュイン活性化による寿命延長効果が示唆されました。

02

安全性試験

慶應義塾大学のグループは**2019年**、健康成人男性を対象としたNMN単回経口投与の安全性試験（用量：**100mg**、**250mg**、**500mg**）において、有害事象がないことを報告しました。

03

長期投与試験

健康成人男性**14名**に**1日250 mg**のNMNを**6か月間**投与した臨床試験では、有害事象なく継続可能であることが確認されました。


04

効果の確認

この試験では、投与後に体内NAD+量の有意な増加が確認され、特に耐糖能異常を有する被験者において、**糖代謝指標の改善**が見られました。

⊗ 留意点と患者指導

- **高価な価格**：NMNサプリメントは比較的高価です。
- **粗悪品の流通**：表示されている含有量と実際の含有量が異なる粗悪品も報告されています。信頼できるメーカーの製品を選ぶよう指導してください。
- **長期的な有効性**：ヒトにおける長期的な抗老化作用やその他の有効性については、今後の大規模臨床試験によるデータ蓄積が引き続き必要です。



新規抗老化成分の動向

近年注目されている、新たな抗老化作用が期待される成分とその研究動向をご紹介します。



ケルセチン・フィセチン

老化細胞除去作用（セノリティクス）が期待されるフラボノイドです。特にフィセチンはイチゴ由来のポリフェノールで、マウス実験では老化細胞のアポトーシス誘導を通じて健康寿命の延長効果が報告されています。



スペルミジン

ポリアミンの一種で、細胞の自食作用（オートファジー）を促進することで抗加齢効果が期待されています。欧州では小麦胚芽由来のスペルミジンサプリメントが一般的に販売されています。



伝統的成分

イチヨウ葉エキス、スッポン粉末、ローヤルゼリーなど、古くから伝わる成分も引き続き人気です。これらの成分には複合的な健康効果が期待されていますが、現代的なエビデンスの蓄積が求められます。



エイジングケアサプリメントの臨床応用ガイド

抗加齢サプリメントの処方は、患者様の年齢や個別のニーズに合わせた組み合わせが鍵となります。効果の評価には時間を要するため、少なくとも**3～6ヶ月**の継続的な摂取を推奨し、以下の具体的な指標で効果を評価します。

肌状態の改善

ハリ、ツヤ、乾燥の程度の変化

自覚症状の評価

倦怠感、睡眠の質の変化、気分の安定

検査値の推移


必要に応じて炎症マーカーやホルモンレベルの確認

30代後半～

肌のハリ低下を訴える患者には、**ビタミンC 500mg/日 + ビタミンE 100mg/日、コラーゲンペプチド5g/日、CoQ10 100mg/日**の組み合わせを推奨します。

更年期女性

ホルモンバランスの変化には、**エクオール（大豆イソフラボン代謝産物）含有サプリメント**の追加が有効です。



NMNは比較的高価なため、まずは**十分な睡眠、定期的な運動**などの生活習慣改善と、基本的な抗酸化ビタミン補給を優先します。その上で、補助的にNMNやレスベラトロールの追加を検討するのが現実的なアプローチです。

⚠ 安全上の留意点

- 脂溶性ビタミンの過剰摂取に注意し、推奨用量を厳守してください。
- 複数のサプリメント併用による肝臓への負担を考慮し、定期的な肝機能チェック（例：3～6ヶ月ごと）を実施してください。



肌荒れ・皮膚トラブル対策 サプリメント：概要



対象となる皮膚トラブル

ニキビ（尋常性ざ瘡）、アトピー性皮膚炎、敏感肌、乾燥肌など、様々な皮膚トラブルの改善を目指します。



体内からのアプローチ

皮膚の状態は、栄養状態、ホルモンバランス、腸内環境などの内的要因と深く関連しています。経口サプリメントは、これらの内的要因を体内から整える効果が期待できます。



補助的な役割

サプリメントは、医療機関での治療や適切なスキンケアの補助として位置付けることが重要です。

ニキビ対策サプリメント成分と具体的な摂取方法

ニキビは皮脂分泌過剰や毛包の角化、アクネ菌増殖、炎症反応などが関与する疾患です。食生活との関連も指摘されており、高GI食（糖質過多）や乳製品の摂取がニキビ悪化因子となり得ます。以下に、ニキビ対策に有効とされるサプリメント成分と、その具体的な摂取目安を解説します。

1

ビタミンB群（B2, B6）

ビタミンB2とB6は皮脂分泌の調整と皮膚代謝の促進に寄与します。特にB2は脂質の代謝を助け、B6はアミノ酸代謝を通じて皮膚の健康維持に関わります。「チョコラBB®」などの市販薬にも配合されています。

- ビタミンB2: 1日10～20mg
- ビタミンB6: 1日10～50mg

注意：ビタミンB6の過剰摂取（200mg/日以上を長期）は、末梢神経障害のリスクがあるため、適量を守りましょう。

2

亜鉛

亜鉛は抗炎症作用を持ち、皮膚の治癒を促進します。アクネ菌の増殖抑制にも関与するとされ、複数のランダム化比較試験（RCT）で炎症性ニキビ病変数の減少が報告されています。

摂取目安: 1日30～50mg。動物性食品（肉、魚介類）から摂取が効率的です。

注意：過剰摂取（100mg/日以上）は銅欠乏を引き起こす可能性があるため、上限量を守りましょう。

3

プロバイオティクス

腸内環境と皮膚の健康は「腸-皮膚軸」として密接に関連しています。特定のプロバイオティクス株、特に **Lactobacillus fermentum**（RC-14）は、ニキビの症状改善に有効性が示されています。

研究データ: RCTでは、L.fermentum株を12週間摂取した群で、総病変数が**32%減少**したとの報告があります。

摂取目安: 菌株によって異なりますが、推奨される摂取量を守りましょう。ヨーグルトや発酵食品からの摂取も有効です。


アトピー性皮膚炎に対するサプリメント

アトピー性皮膚炎（AD）は皮膚バリア機能障害と免疫異常を特徴とします。特に、腸内環境と皮膚の健康の関連（「腸-皮膚軸」）が注目されており、プロバイオティクスが症状改善に寄与する可能性が示唆されています。

プロバイオティクスのエビデンス

症状改善

メタ解析では成人AD患者において、プロバイオティクス使用群でSCORAD（症状スコア）が平均**-7.9ポイント**有意に低下し、生活の質改善も報告されています。



SCORAD 改善

メタ解析で平均**-7.9ポイント**の症状スコア改善。

作用機序

Lactobacillus属やBifidobacterium属の単独または混合摂取により、皮膚のかゆみや炎症が軽減。乳酸菌L.プランタラム株を8週間投与した試験では、IL-4やIgE（アレルギー関連物質）の低下とともに症状改善が認められました。

● 推奨菌株

L.ラムノサスGG

● 推奨菌株

L.プランタラム

● 推奨菌株

B.ロングム

① **小児への予防的アプローチ:** 妊娠中から母体にプロバイオティクスを投与することで、小児のアトピー性皮膚炎発症リスクが低下するとの報告もあります。



必須脂肪酸とビタミンDの役割

アトピー性皮膚炎（AD）の症状緩和には、必須脂肪酸とビタミンDの適切な摂取が重要です。これらは皮膚のバリア機能強化と免疫調節に貢献します。

1

γ-リノレン酸（GLA）

皮膚バリアの脂質構成を改善し、抗炎症作用をもたらします。

- **摂取源**：月見草油、ボラージ油、ヘンプシード油
- **推奨量**：GLAとして1日200～300mg
- **効果**：体内で抗炎症性のPGE1に変換され、かゆみや炎症を和らげる効果が期待されます。

2

ビタミンD

AD患者に不足しがちな栄養素で、免疫応答と皮膚バリア機能に影響します。

- **血中濃度**：AD患者では血中25(OH)D濃度が低い傾向にあります。
- **推奨量**：冬季に1600 IU/日（約40μg）の補充を推奨。
- **研究結果**：ランダム化比較試験（RCT）では、この用量でAD症状の有意な改善が報告されています。

- ❑ **患者指導のポイント**：サプリメントは補助的なものであり、必ず医師や専門家と相談の上、適切な用量を守って摂取してください。



皮膚トラブル対策の臨床応用ガイド

皮膚トラブルに対するサプリメントの活用は、**通常の治療を補完する形で**位置づけることが重要です。個々の症状に応じた具体的なアプローチを以下に示します。

ニキビ患者へのアプローチ

中等度のニキビ患者には、外用レチノイドや過酸化ベンゾイルといった**標準治療に加え、亜鉛30 mg/日を3ヶ月間内服**することを推奨します。抗生剤を使用する場合は、腸内環境保護のためプロバイオティクスを併用してください。

アトピー性皮膚炎（AD）

AD治療はスキンケアと薬物療法が主体ですが、**難治性の成人AD患者**においてはプロバイオティクス（例：乳酸菌）の投与を検討します。過去の研究では、乳酸菌含有飲料を**12週間摂取**することでSCORADスコアの有意な改善が報告されています。


生活習慣指導の重要性

サプリメントだけでなく、包括的なアプローチとして生活習慣の改善指導を行います。具体的には、**食事のGI（グリセミック指数）コントロール**や**適切な保湿習慣**を徹底することで、皮膚トラブルの根本的な改善と再発予防を目指します。

発毛・育毛サプリメント (脱毛対策)：概要

脱毛（抜け毛）や薄毛は、男性のみならず女性にとっても大きな悩みです。標準治療は男性型脱毛（AGA）に対するフィナステリド内服やミノキシジル外用など医薬品ですが、栄養補給による毛髪の質改善や成長促進も補助療法として重要です。

毛髪は主にケラチンというタンパク質から成り、ビタミン・ミネラルも発毛サイクルに関与します。そのため、発毛・育毛サプリメントとして様々な成分が検討されています。



ビオチン（ビタミンB7）の育毛効果

ビオチンの働き

「髪のビタミン」として知られ、多くの育毛サプリに配合されています。体内では以下の役割を担います。

- カルボキシラーゼ酵素の補因子として機能
- アミノ酸代謝や脂肪酸合成をサポート
- ケラチン産生を支え、健康な毛髪・爪の維持に貢献

育毛効果のエビデンス

ビオチン欠乏症は稀ですが、欠乏時には脱毛や爪の脆弱化が生じます。

一方で、健康な人における追加摂取での明確な効果エビデンスはまだ不足しています。しかし、一部の薄毛患者の自己申告では、髪のハリ・コシの向上、枝毛や切れ毛の減少といった報告がされています。

⚠ 検査値への影響

大量のビオチン補給（特に1日10mg以上）は、甲状腺機能検査（TSHなど）や心筋梗塞診断マーカー（トロポニンなど）の**血液検査値に影響を与える可能性があります**。

採血前数日間の服用中止が推奨されますので、事前に医師や検査機関にご相談ください。



Biotin

Hair Vitamin

ミネラル（亜鉛・鉄）と育毛の重要性

亜鉛欠乏と鉄欠乏は、脱毛症の一般的な原因として広く認識されています。特に女性のびまん性脱毛症では、しばしば低亜鉛血症や鉄欠乏性貧血が認められるため、適切なミネラル補充が育毛には極めて重要です。



亜鉛（Zinc）

亜鉛は、髪の毛の成長に必要なタンパク質合成や細胞分裂をサポートします。また、抗炎症作用や皮膚の治癒促進作用も持ち、ニキビ治療補助にも有用です。臨床研究では、亜鉛摂取により脱毛症患者の髪の毛の密度が改善した報告もあります。推奨される摂取量は**1日30～50mg**ですが、長期的な高用量摂取は銅欠乏を引き起こす可能性があるため注意が必要です。



鉄（Iron）

鉄は酸素を全身に運び、毛母細胞の活動にも不可欠です。鉄欠乏性貧血、特に貯蔵鉄を示すフェリチン値が低い場合、毛髪が薄くなりやすい傾向があります。これは、毛髪の成長サイクルに悪影響を及ぼすためです。月経過多の女性など、鉄欠乏のリスクが高い場合は、専門医の指導のもとで積極的に補充することが推奨されます。



セレン（Selenium） & ケイ素（Silicon）

セレンは強力な抗酸化作用を持ち、毛包の健康維持に寄与します。セレン欠乏もまた、毛髪の脆弱化や抜け毛の一因となることが知られています。通常の食事からの摂取が難しい場合は、**1日50μg程度**の補給を検討すると良いでしょう。

ケイ素は毛髪の主要成分であるコラーゲン構造の形成に関与しており、髪の毛のハリやコシを保つ上で重要な役割を果たします。自然界ではスギナ（ホーステイル）エキスなどに豊富に含まれており、サプリメントとして利用されることもあります。

アミノ酸と総合育毛サプリメント

含硫アミノ酸とケラチン合成

毛髪の主成分であるケラチン合成には、**L-シスチン**（システインの二量体）や**メチオニン**といった含硫アミノ酸が必須です。

パントガール (Pantogar)

女性のびまん性脱毛症向けに処方される育毛剤で、**L-シスチン60 mg/日**に加え、医療用酵母、パントテン酸Caなどが配合されています。

臨床効果

6ヶ月間のPantogar投与により、毛髪の毛径拡大および**本数増加**が報告されています。また、コラーゲン由来ペプチド（ケラシンなど）も毛髪フィブリルの強度向上を目的に配合されます。



Viviscal®の臨床データ

サメ軟骨由来の海洋性たんぱく複合体（AminoMar C）を主成分とし、シリカ、ビタミンC、亜鉛、ビオチンなどを配合したサプリメントです。

32

平均毛髪本数増加

女性の一過性薄毛に対するRCT（ランダム化比較試験）にて、**90日後に平均で32本の終毛本数増加**が確認されました。

18%

増加率

上記32本の増加は、平均して**18%の改善**に相当します。

atin Synthe

ハーブ・植物由来成分の育毛効果

植物由来成分として、ノコギリヤシ（ソーパルメット）やカボチャ種子油、イソフラボンなどが男女の脱毛症に対して研究されており、その効果が期待されています。

ノコギリヤシ (Saw Palmetto)

5αリダクターゼ酵素を阻害し、男性ホルモンであるテストステロンのジヒドロテストステロン（DHT）への変換を抑制します。ある研究では、**320mg/日**投与群の約**40%**に毛量改善がみられましたが、標準治療であるフィナステリドと比較すると効果は穏やかであるとされています。

イソフラボン (Isoflavones)

大豆などに含まれる植物エストロゲン的一种で、特に女性のホルモンバランスを整えることで薄毛の改善に寄与すると考えられています。特に、腸内細菌によってイソフラボンが代謝されて生成される**エクオール**を含むサプリメントで、女性の毛量スコアの改善が報告されており、注目を集めています。

1

2

3

カボチャ種子油 (Pumpkin Seed Oil)

韓国で行われたランダム化比較試験（RCT）では、男性型脱毛症患者がカボチャ種子油を**400mg/日**で**24週間**摂取した結果、プラセボ群と比較して毛髪数が**40%**増加したという有意な改善が報告されています。これは、カボチャ種子油がDHT生成に関わる酵素を阻害する可能性を示唆しています。



育毛サプリメントの臨床応用ガイド

育毛サプリメントは、脱毛症の原因に応じて適切な成分を補うことが重要です。治療を開始する前に、脱毛症患者の皆様には、血液検査を通じて鉄欠乏、亜鉛不足、甲状腺機能低下などの潜在的な原因がないか確認し、必要に応じて補充療法を行うことを推奨します。



月経過多女性

フェリチン低下による**びまん性脱毛**が多い傾向にあります。この場合、**鉄剤**と**ビタミンC**を併用して貯蔵鉄の改善を図り、同時に**L-シスチン**、**ビオチン**、**ビタミンB群**を含有する育毛サプリメントの併用が有効です。



AGA男性

アンドロゲン性脱毛症（AGA）に対しては、**フィナステリド**や**デュタステリド**が第一選択薬となります。しかし、内服薬に抵抗がある患者様や、より積極的な効果を求める方には、**ノコギリヤシ320mg/日**のサプリメント併用を検討することが推奨されます。



産後脱毛

産後の脱毛は一時的な生理的変化であることが多いですが、精神的な負担を軽減するためにも対策が有効です。**総合ビタミン・ミネラルサプリメント**による栄養補給と、**育毛シャンプー**を組み合わせることで、自然な回復プロセスを促進します。

治療効果のモニタリングには、定期的な**標的部位の毛髪写真撮影**や**毛髪密度の計測（フォトリログラム）**が非常に有用です。これにより、サプリメント併用による効果判定を客観的に行うことができます。また、患者様には「**毛周期の関係で、効果を実感するまでに数ヶ月の期間が必要である**」ことを事前に説明し、栄養バランスの取れた食事や十分な睡眠など、生活習慣の改善も含めた包括的な指導を行うことが重要です。



ダイエット・体重管理サプリメント：概要

減量（ダイエット）補助を目的とするサプリメントも美容領域で関心が高いものの一つです。肥満は健康面のみならず外見上の悩みとしても相談が多く、食事療法や運動療法に加えて「脂肪燃焼サブリ」「食欲抑制サブリ」などが用いられます。

脂肪代謝促進

体内の脂肪燃焼を助け、エネルギー消費を高める。

食欲抑制

満腹感を持続させ、過剰な食事摂取を抑える。


吸収阻害

糖質や脂質の消化・吸収を阻害し、体への蓄積を減らす。

代謝向上

基礎代謝を高め、安静時のエネルギー消費量を増加させる。

- ④ これらのサプリメントは、あくまで食事療法や運動療法を補完する補助的な役割であり、それら単独で効果を示すものではないことを患者に明確に理解してもらうことが重要です。



カフェイン・緑茶エキス (カテキン) の効果

カフェインは中枢神経を興奮させ、脂肪分解を促進することで、わずかにエネルギー消費を高めます。緑茶に含まれるカテキン（特にEGCG）はカフェインと相乗して脂質代謝を促進し、腸からの脂肪吸収を抑制する作用も期待されます。

複数の研究をまとめたメタ解析では、緑茶由来カテキンとカフェインの併用により、平均**1.3 kg**程度の体重減少効果が認められています。特に普段カフェイン摂取が少ない人やアジア人では効果が出やすい傾向が見られました。

日本人対象の試験では、**1日570 mg**のカテキンを含むお茶を**12週間**飲用した群で内臓脂肪が有意に減少したという結果も報告されています。

1.3kg

体重減少

（メタ解析での平均効果）

300mg

1日目安量

（EGCG推奨量）



食物繊維・吸収抑制系サプリメント

食物繊維（特に水溶性）は胃で膨張して満腹感を高め、食事量を減らす効果が期待できます。中でも、顕著に水を吸って膨らむ**グルコマンナン**（こんにゃく由来多糖）は、海外で減量補助サプリとして人気です。

グルコマンナン

複数のメタ解析において、グルコマンナン摂取群でプラセボ群に比べ有意な体重減少が認められています。具体的な効果としては、**平均1.27kgの体重減少**（8週間、1日3g摂取の場合）が報告されています。

推奨摂取方法：食前に**1～2g**をコップ1杯（200ml以上）の水で摂取してください。

白インゲン豆抽出物

炭水化物分解酵素である α -アミラーゼを阻害し、食事由来の糖質吸収を一部ブロックします。ある米国での試験では、**1,500mg**を食前に摂取した群がプラセボ群と比較して**有意な体重減少**を示したと報告されています。

推奨摂取方法：高炭水化物食の前に**500～1,500mg**を摂取してください。

⊗ 重要な注意事項

グルコマンナンは水なしで摂取すると食道で膨張し詰まる危険性があるため、必ず**多めの水（最低200ml）**と共に服用し、摂取後も追加で水分を摂るようにしてください。

脂肪燃焼・代謝促進系サプリメント

脂肪燃焼・代謝促進系のサプリメントは、体内の脂肪利用を促し、エネルギー消費を高めることで体重管理をサポートします。以下に代表的な成分とその作用、推奨される摂取量・期間をまとめました。

L-カルニチン

脂肪酸をミトコンドリアに運搬し、脂肪燃焼を助けます。肥満者を対象としたメタ解析では、L-カルニチン補給により**平均1.2kgの体重減少**が認められています。

推奨用量: 1日1〜2gを食後または運動前に摂取します。

カプサイシン（唐辛子抽出物）

アドレナリン分泌を促し、代謝をわずかに亢進させます。特定の研究では、数十mgのカプサイシン相当量でエネルギー消費が**数%上昇**するとの報告もありますが、長期的な耐性形成により効果の持続性は限定的です。

推奨用量: 個人差が大きいため、少量から開始し、体調に合わせて調整します。

共役リノール酸（CLA）

不飽和脂肪酸の一種で、脂肪細胞への脂肪取り込みを減らす作用が動物実験で示されています。人でのメタ解析では**平均0.7kgの体重減少**が認められましたが、効果は限定的であり、長期的な安全性については議論が続いています。

推奨用量: 1日3.4gが推奨されることが多いですが、臨床的な有効性はまだ確立されていません。

① 重要なアドバイス

これらのサプリメントは、適切な食事制限と運動と併用することで最大の効果を発揮します。単独での過度な期待は避け、専門家と相談の上で利用を検討してください。




プロバイオティクスと体重管理：腸内環境改善によるアプローチ

近年、腸内細菌叢が肥満に与える影響が注目されており、プロバイオティクスの補給が体重や体脂肪の管理に寄与する可能性が示唆されています。複数の研究を統合したメタ解析では、プロバイオティクス（特に乳酸菌やビフィズス菌）の継続的な摂取により、対照群と比較して平均で**0.6kgの体重減少**が報告されています。


特定の効果的な菌株と具体的データ

中でも興味深い研究として、日本の臨床試験では、**Lactobacillus gasseri SBT2055株**を含む発酵乳を**12週間**摂取したグループにおいて、内臓脂肪面積の有意な縮小が確認されました。



プロバイオティクス摂取の多角的なメリット

- **全身の炎症低減:** 腸内環境の改善は、肥満と関連する全身性の軽度炎症を抑制し、代謝機能の正常化に寄与します。
- **エネルギー代謝への影響:** 腸内細菌叢は短鎖脂肪酸の産生を通じて、エネルギー収支や食欲調節ホルモンに影響を与える可能性があります。
- **高い安全性と副次的効果:** プロバイオティクスは一般的に安全性が高く、便秘改善、肌質の向上、免疫力向上など、体重管理以外の健康面でのメリットも期待できます。



L.gasseri SBT2055株摂取による内臓脂肪減少

crobion



ダイエットサプリメントの 臨床応用ガイド

減量サブリはあくまで補助であり、食事療法・運動療法が主軸です。そのことを患者に十分理解させた上で、安全性が高く一定のエビデンスがあるものを選びます。

01

メタボ傾向の患者

食後に難消化性デキストリン**5g**をお茶に溶かして飲むよう指導し、**食後の血糖値上昇を穏やかにします**。昼食前に緑茶カテキン**200mg**＋カフェイン**50mg**を併用し、**脂肪燃焼を促進**します。

02

食欲過多の患者

食事**20～30分前**にグルコマンナン**1g**をコップ1杯の水で飲む方法を提案。水分を吸収して膨張し、**満腹感が出やすくなり過食抑制**が期待されます。

03

筋肉量維持希望

朝食や間食にホエイプロテイン**20g**を摂取させ、**筋肉の分解を防ぎ空腹感を和らげ**ます。運動と組み合わせることで**代謝維持に繋がり、リバウンド防止**にも役立ちます。

体重減少は緩徐でも継続することが重要です。週**500 g**減程度を目標にサブリ＋生活改善プランを設計し、定期フォローで励ましながら取り組むことが成功の鍵となります。



腸内環境改善サプリメント：概要

腸内フローラ（腸内細菌叢）の健全化は、美肌や全身の健康に密接に関わっています。腸は栄養吸収だけでなく免疫の中心でもあり、「腸内環境を整えれば肌も整う」という概念（いわゆる腸-皮膚軸）が提唱されています。

このため、美容クリニックでも腸活（Gut health）を勧めるケースが増えてきました。腸内環境改善に用いられる主なサプリメントは以下の3種類です。



プロバイオティクス

生きた善玉菌（乳酸菌、ビフィズス菌など）を摂取し、腸内フローラのバランスを改善します。



プレバイオティクス

善玉菌の「エサ」となる難消化性成分（食物繊維、オリゴ糖など）を摂取し、腸内での善玉菌の増殖を促します。



シンバイオティクス

プロバイオティクスとプレバイオティクスの両方を組み合わせたもので、より効果的に腸内環境を整えます。

プロバイオティクス（乳酸菌・ビフィズス菌製剤）

ニキビやアトピーの改善にも寄与するとされる経口プロバイオティクスは、皮膚炎症の軽減や免疫バランスの調整に有効です。さらに、便秘改善やメンタルストレス緩和といった全身状態の向上が、肌荒れ軽減やクマ改善などの美容効果に繋がるとの研究報告が増えています。



L.ロイテリ菌

ある研究では、12週間摂取した被験者で**皮膚のツヤとハリが増し、幸福感が向上した**と報告されています。この菌は「飲むスキンケア」としての役割が期待されており、美容目的での活用が進んでいます。



L.プランタラム

動物実験では、紫外線照射したマウスにL.プランタラムを与えることで**シワ形成が抑制された**ことが示されています。ヒトにおいても、乳酸菌摂取が**皮膚真皮の弾力に関与する遺伝子発現を変化させる**可能性が報告されており、肌のハリや弾力改善への貢献が期待されます。



市販製品例と摂取目安

主要な市販製品としては、**ビフィズス菌BB536**、乳酸菌シロタ株（ヤクルト）、**L.カゼイ菌**などを含むサプリメントや乳酸菌飲料があります。これらのプロバイオティクスは、**1日あたり100億個以上の菌を継続的に摂取**することで、効果が得られやすいとされています。



プレバイオティクス（難消化性成分）

善玉菌の「エサ」となる難消化性オリゴ糖（フラクトオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖など）や食物繊維（イヌリン、アカシアガム等）は、腸内でビフィズス菌などを増やし、短鎖脂肪酸を産生します。

短鎖脂肪酸の効果

- 腸管バリア機能の強化
- 全身の抗炎症作用
- 美肌効果
- 肥満予防

例えば、イヌリンを毎日**5g**摂取した試験では、腸内の酪酸産生菌が増加し、炎症指標が低下したと報告されています（Reference: Holscher, H. D. (2017). Dietary fiber and prebiotics and the gastrointestinal microbiota. Gut Microbes, 8(2), 172-184.）。

5-10g

1日の推奨摂取量

オリゴ糖・食物繊維

患者への指導内容

サプリメントで摂取する場合は、便秘や下痢のリスクを避けるため、少量（1-2g）から開始し、徐々に増量して自分に合った量を見つけてみましょう。過剰摂取は腹部膨満感やガスを引き起こす可能性があります。



シンバイオティクスとその他の腸活成分

1 シンバイオティクス：相乗効果で腸内環境を最適化

プロバイオティクス（善玉菌）とプレバイオティクス（そのエサ）を同時に摂取するアプローチです。例えば、乳酸菌（プロバイオティクス）とオリゴ糖・食物繊維（プレバイオティクス）を組み合わせることで、腸内での善玉菌の増殖を効果的に促進し、相乗的な腸活効果が期待されます。

- **研究報告例:** ある研究では、シンバイオティクスの摂取によりビフィズス菌の数が有意に増加し、腸内フローラのバランス改善が示されています。
- **具体的な指導:** 朝食時にヨーグルトと水溶性食物繊維（イヌリンなど）を一緒に摂取する、シンバイオティクス配合のサプリメントを活用するなど。

2 消化酵素サプリ：お腹の不快感を軽減

リパーゼ（脂質分解）、プロテアーゼ（タンパク質分解）、アミラーゼ（炭水化物分解）などの消化酵素は、食事の消化吸收を助け、腸内での未消化物の発酵ガス産生を抑制します。これにより、食後の膨満感やガスのお悩みを緩和する効果が期待されます。

- **具体的な効果:** 特に、消化不良によるお腹の張りや不快感を改善するのに役立ちます。美容への直接的な影響は少ないですが、お腹の調子が整うことで間接的な良い影響が考えられます。
- **摂取の目安:** 食事中または食前に、製品推奨量を目安に摂取します。

3 ポリフェノール類：腸内細菌と美容へのアプローチ

緑茶抽出物（カテキン）、赤ワインエキス（レスベラトロール）、カカオ由来ポリフェノールなどは、腸内で特定の代謝物を生成し、善玉菌の多様性を高めることが示唆されています。これらポリフェノール代謝物には、抗酸化作用や抗炎症作用があると考えられています。

- **研究報告例:** カカオ由来ポリフェノールの継続的な摂取が、肌のきめや弾力性の改善につながったという研究報告もあります。
- **具体的な摂取源:** ダークチョコレート（カカオ70%以上）、ベリー類、緑茶、赤ワインなど。サプリメントで補給する場合は、1日100mg～500mgを目安に摂取。

腸内環境改善サプリの臨床 応用ガイド

腸内環境の改善は全身状態の底上げとして捉えると良いでしょう。慢性的な便秘や肌荒れ、疲労感を訴える患者には、まず食生活指導（食物繊維と発酵食品を増やす）を行い、並行してプロバイオティクス補充を勧めます。

初期アプローチ

毎朝乳酸菌飲料（例：ヤクルト®）1本＋ビフィズス菌サプリー1包（推奨量）を継続してもらい、**1ヶ月後**に便通や肌の調子を確認します。

効果不十分時

プレバイオティクス（例：オリゴ糖5gを朝食ヨーグルトに混ぜる等）を追加し、シンバイオティクス療法へ移行。2週間継続で効果を再評価します。

抗生剤併用時

尋常性ざ瘡や慢性副鼻腔炎など抗生剤長期内服が必要なケースでは、腸内細菌サポートとしてプロバイオティクスを**抗生剤と時間をずらして併用**し、消化器系副作用軽減に努めます。

腸内環境改善の効果指標として、便性状（形状やにおい）の変化や、患者自身のお腹の軽さ、さらに血液検査で炎症マーカー（高感度CRP）が**基準値以下へ低下**するケースも確認されています。腸が整うと睡眠の質が向上し、それが肌の修復に寄与するといった二次効果も期待できます。



プロテイン（タンパク質） 補給と美容：概要

プロテインサプリメントは筋肉増強のイメージが強いですが、美容医療においても重要な役割を担います。特に、筋肉量維持による基礎代謝向上や、健やかな肌・髪・爪を構成する材料補給の観点から注目されています。

ダイエット時の筋肉減少予防

減量中の筋肉維持は、代謝低下を防ぎリバウンドしにくい体づくりに不可欠です。

高齢者のサルコペニア対策

加齢による筋肉量減少（サルコペニア）は、美容面だけでなく全身の健康維持にも影響します。


コラーゲン産生の材料供給

タンパク質は、肌のハリや弾力を保つコラーゲン生成に不可欠なアミノ酸の供給源です。

肌・髪・爪の健康維持

これらは全てタンパク質を主成分とするため、十分な摂取がその健康と美しさをサポートします。

このようにプロテイン補給は、美容クリニックでの栄養療法の一環として非常に価値の高い分野です。具体的な数値や製品については、後のカードで詳しく解説します。



Collagen Synthesis
Muscle Maintenance
Healthy Skin and Hair

ホエイプロテインの特徴と注意点

ホエイプロテインは牛乳由来の乳清タンパクであり、**アミノ酸スコアが高く、特に必須アミノ酸（ロイシンなど）が豊富**です。消化吸収が速く、運動後の筋タンパク合成促進に役立ちます。

美容面でのメリット

- **筋肉量維持**：基礎代謝向上により、太りにくい体質をサポートします。
- **血行・姿勢改善**：良好な筋肉維持は血行を促進し、美しい姿勢にも貢献します。
- **抗酸化作用**：システインを多く含み、グルタチオン合成を促進することで抗酸化能を高めます。
- **成長因子・免疫グロブリン**：肌の健康や免疫機能に良い影響を与える成分を含有しています。

摂取量の目安とタイミング

運動習慣のある方の場合、**1回あたり20～30gを1日1～2回**摂取することが一般的です。運動直後や朝食時など、栄養補給が必要なタイミングでの摂取が推奨されます。

⚠ 患者様への指導ポイント

ホエイプロテイン摂取時は、水または低脂肪乳で溶かすことで余分なカロリー摂取を抑えられます。味のバリエーションも豊富なので、飽きずに続けられるものを選びましょう。

ニキビとの関連性：注意点

⚠ IGF-1とインスリン分泌への影響

ホエイプロテイン摂取は、一部でIGF-1（インスリン様成長因子-1）やインスリン分泌を促進し、ニキビ悪化との関連が指摘されています。ある疫学調査では、ニキビ患者の47%がホエイプロテイン利用経験者であったのに対し、健常肌の群では28%に留まり、有意差が認められました。

ニキビが気になる患者様には、プロテイン摂取による肌状態の変化を注意深く観察するよう指導し、必要に応じて代替のプロテイン（ソイプロテインなど）への切り替えを検討することも重要です。



カゼインプロテインとソイプロテイン



カゼインプロテイン

- **特徴:** 牛乳タンパクの約80%を占める。消化吸収が非常にゆっくりで、約7時間かけてアミノ酸を供給。
- **主な利用:**
 - **夜間の筋分解抑制:** 就寝前（例: 20-30g）の摂取で、長時間にわたりアミノ酸を供給し、夜間の筋肉異化を防ぐ。
 - **ダイエット時の満腹感維持:** 胃に長く留まるため、少量でも満腹感が持続。食欲抑制に寄与し、ダイエットサポートに効果的。
- **美容面:** 皮膚や髪のアターンオーバー、コラーゲン合成にも有益とされる。



ソイプロテイン

- **特徴:** 大豆由来の植物性プロテイン。イソフラボンを豊富に含有。
- **主な利用:**
 - **女性ホルモン様作用:** イソフラボンが女性ホルモン（エストロゲン）と似た働きをするため、更年期女性の骨量維持や肌状態（例: 肌のハリ・潤い）の改善に貢献する可能性が示唆されている（例: 論文Aによる報告）。
 - **男性ホルモン関連症状の改善:** エクオール産生により男性ホルモンの働きを部分的にブロックする作用があり、女性の薄毛やニキビの改善データも報告されている（例: 研究Bの検証結果）。
- **その他:** 植物性で乳糖を含まないため、乳糖不耐症の方やヴィーガンの方にも適している。



コラーゲンプロテインとその他のプロテイン源

コラーゲンプロテイン

純粋な「たんぱく質補給源」としては必須アミノ酸のトリプトファンが不足するため、他のプロテインと併用する形が望ましいです。

- **美容目的:** コラーゲン特有のアミノ酸組成（プロリン、グリシンなど）を生かし、皮膚の弾力性改善やシワの軽減に寄与します。
- **関節の健康:** 関節軟骨の主成分であるII型コラーゲンの材料となり、関節痛の軽減に役立つ可能性があります。研究では、5～10g/日のコラーゲンペプチド摂取で、数週間から数ヶ月で関節痛や皮膚状態の改善が見られたと報告されています。

新しい植物性プロテイン源

エンドウ豆プロテイン、米プロテイン、ヘンプ（麻の実）プロテインなど、多様な植物性プロテインが増えています。

- **多様な選択肢:** アレルギー体質の方やヴィーガンの方でも安心して摂取できます。
- **環境負荷低減:** 動物性プロテインと比較して、生産における環境負荷が低い点が注目されています。
- **アミノ酸バランス:** 複数の植物性プロテインをミックスした製品は、不足しがちなアミノ酸を補完し合い、総合的な栄養価を高める利点があります。



プロテインサプリメントの臨床応用ガイド

プロテインサプリは美容クリニックでも栄養療法の一環として取り入れる価値があります。患者の目的や体質に応じて適切なプロテインを選択し、総合的なケアプランに組み込むことが重要です。

1

ダイエット希望患者への具体的な指導

朝食をプロテインシェイクに置き換え、総摂取カロリーを効果的に抑えつつ、必要なタンパク質を確保します。これにより、筋肉量の維持と基礎代謝の低下防止を両立しながら、**体重の3～5%減**を目指す具体的な減量計画をサポートします。

2

術後の創傷治癒促進とダウンタイム短縮

美容外科手術やレーザー治療を受けた患者には、治療前後で十分なタンパク質摂取を指導します。特に**術後2週間**は通常の**1.5倍のタンパク質摂取（体重1kgあたり1.5～2.0g）**を推奨し、皮膚の治癒を促進し、**ダウンタイムを約20%短縮**する効果が期待できます。

3

高齢患者のサルコペニア予防と間接的な美容効果

筋肉の衰えは見た目の老いにも直結します。サルコペニア気味の高齢患者には、**1日20gのホエイプロテイン補給**と適度な運動を組み合わせたプログラムを提供。これにより、身体機能の改善（例: **歩行速度の10%向上**）を通じた間接的な美容効果を狙います。

具体的な摂取目標として、**体重1kgあたり1.0～1.5g/日のタンパク質摂取**を推奨し、食事での不足分をプロテインで補います。例えば、体重50kgの患者の場合、1日の目標は50～75gです。普段の食事では30gしか摂取できていない場合、プロテインで追加で20～45gを補給するよう指導します。



美容サプリメントの安全性管理

美容目的でのサプリメント使用において、安全性の確保は医師の重要な責務です。サプリメントは食品扱いであるため副作用情報が十分集積されていない場合もあり、適切な監視と患者指導が必要です。



国内外の安全情報に注意

FDA警告や国内外の健康被害情報（例：グルタチオン点滴のリスク、過剰ビタミンA摂取の肝機能障害など）に常に目を配り、最新の知識を共有します。



肝腎機能への配慮と検査

複数のサプリを服用する患者では、肝腎機能への負荷や相互作用に留意し、必要に応じて定期的な血液検査（肝機能、腎機能、電解質など）を実施します。



薬物相互作用の評価

処方薬との相互作用に特に注意を払い、抗凝固薬、血糖降下薬、免疫抑制薬などとの併用時は、患者が服用中の薬剤をすべて把握し、慎重に評価・判断します。



患者カウンセリングのポイント

サプリメント療法の成功には、患者との適切なコミュニケーションが不可欠です。過度な期待を抱かせることなく、現実的な目標設定と継続可能な計画を立てることが重要です。



期待値の調整

サプリメントは「魔法の薬」ではなく、生活習慣の改善を支援する補助的な役割であることを明確に説明します。即効性を求める患者には、効果が現れるまでに数週間～数ヶ月かかる場合があることを丁寧に説明します。




個別化されたアプローチ

患者の年齢、性別、生活習慣、既往歴、現在の治療内容を総合的に評価し、その人に最適なサプリメントの種類、用量、および組み合わせを提案します。




モニタリング計画

定期的なフォローアップスケジュール（例：数週間～数ヶ月おき）を設定し、効果の評価と安全性の確認を継続的に行います。必要に応じて用量調整やサプリメントの種類変更、または血液検査などの追加評価を検討します。



エビデンスレベルの評価基準

美容サプリメントの推奨には、科学的根拠の質を適切に評価し、患者に正確な情報を提供することが重要です。エビデンスレベルに応じた推奨度の調整が求められます。



1 レベル1: 高信頼性

複数のランダム化比較試験（RCT）、系統的レビュー、メタ解析。最も信頼性が高い。

2 レベル2: 中信頼性

単一のランダム化比較試験、コホート研究、症例対照研究。


3 レベル3: 低信頼性

症例報告、動物実験、in vitro（試験管内）研究。ヒトでの効果は不明確。

4 レベル4: 根拠なし

理論的根拠のみ、専門家の意見、または経験的知見。科学的根拠はほとんどない。

例えば、トラネキサム酸（500～750mg/日）による肝斑改善や、プロバイオティクスによるアトピー性皮膚炎の症状緩和は、比較的確立されたエビデンスに基づいています。一方で、プラセンタやNMNのように、まだ研究段階にあり、ヒトでの有効性や安全性が十分には確立されていないものもあります。医師は最新の文献を常にフォローし、根拠の強さに応じて患者への推奨度を調整し、過度な期待を抱かせないよう具体的な情報提供に努めるべきです。



年代別サプリメント推奨パターン

患者の年代に応じたサプリメントの組み合わせや重点ポイントを提案することで、ライフステージに合わせたオーダーメイドのアプローチが可能になります。具体的な指導内容を含め、以下に推奨パターンを示します。

20代～30代前半

予防・基本ケア重視

- **ビタミンC 1,000mg/日 + E 200mg/日:** ニキビ、紫外線対策、肌の抗酸化サポート。
- **亜鉛 15mg/日:** 肌のターンオーバー促進、免疫力維持。
- **プロバイオティクス（乳酸菌/ビフィズス菌）:** 腸内環境改善による肌荒れ予防、免疫調整。

指導内容: 日常的なストレスや不規則な食生活による影響を考慮し、基本的な栄養補給と肌トラブル予防を意識した摂取を推奨。バランスの取れた食事との併用が重要です。

50代～60代

更年期・本格アンチエイジング

- **エクオール 10mg/日:** 更年期症状の緩和、骨密度維持、肌の乾燥改善。
- **NMN 250mg/日:** サーチュイン遺伝子活性化による細胞レベルの若返り、代謝機能維持。
- **総合ビタミン・ミネラル:** ホルモンバランスの乱れによる栄養不足を補完。

指導内容: ホルモンバランスの大きな変化に対応するため、特に更年期症状の緩和と代謝低下対策を重視。骨粗しょう症や生活習慣病予防の観点からも包括的なケアを推奨します。

1

2

30代後半～40代

エイジングケア開始・初期兆候対策

- **コラーゲンペプチド 5,000～10,000mg/日:** 肌のハリ・弾力低下の予防、シワ対策。
- **CoQ10 (ユビキノール) 100mg/日:** 細胞のエネルギー産生サポート、肌の老化予防。
- **美白サプリ (L-シスチン、ポリフェノール類):** シミ・色素沈着の予防と改善。

指導内容: 加齢による肌の変化が顕著になる時期。肌の表面だけでなく、体の内側からのアプローチでエイジングケアを開始。紫外線対策の徹底も併せて指導します。

3

4

70代以降

フレイル予防・QOL維持

- **プロテイン（ホエイ/ソイ） 20g/日:** 筋力維持、サルコペニア予防。
- **ビタミンD 1,000～2,000IU/日:** 骨密度維持、免疫力向上、転倒予防。
- **オメガ3脂肪酸（EPA/DHA） 1,000mg/日:** 脳機能維持、炎症抑制、心血管系疾患予防。

指導内容: 全身機能の維持とQOL向上を最優先。特に筋肉量と骨密度の維持、認知機能のサポートが重要です。食事からの摂取が難しい場合は、サプリメントで積極的に補うことを提案します。

性別によるサプリメント推奨の違い

患者様の性別に応じて、健康課題や生理機能に合わせたサプリメントの選択が重要です。以下に、男女それぞれに特に推奨されるサプリメントとその目的を示します。

女性向けの特別な配慮

鉄欠乏対策

月経による鉄損失を考慮し、**鉄10～20mg/日**を推奨。ビタミンC（100～200mg/日）との併用で吸収率が向上します。

葉酸

妊娠可能年齢の女性には、胎児の神経管閉鎖障害リスク低減のため、**400μg/日**の摂取が推奨されます。

カルシウム・ビタミンD

骨密度維持、特に閉経後の骨粗しょう症予防のために、**カルシウム600～800mg/日 + ビタミンD 200～400IU/日**を推奨します。

イソフラボン/エクオール

更年期症状（ホットフラッシュ、骨密度低下など）の軽減や美肌効果を期待して、**イソフラボン25～40mg/日（エクオールとして10mg/日相当）**の摂取を検討します。

美白・肝斑対策

肝斑改善には**トラネキサム酸（TXA）500～750mg/日**、全体的な美白には**ビタミンC 1,000～2,000mg/日 + L-システイン 240～500mg/日**の組み合わせが効果的です。

男性向けの特別な配慮

AGA（男性型脱毛症）対策

抜け毛の抑制や毛髪健康維持のために、**ノコギリヤシ320mg/日、亜鉛10～15mg/日、ビオチン1,000～5,000μg/日**の組み合わせを推奨します。

筋肉量維持・増強

運動後の回復と筋肉成長をサポートするため、**ホエイプロテイン（体重1kgあたり1.5～2.0g/日）、BCAA（運動前後に2,000mg以上）、クレアチン（ローディング期20g/日、維持期5g/日）**が有効です。

前立腺ケア

前立腺の健康維持と肥大予防には、**リコピン10～30mg/日、セレン50～100μg/日、ノコギリヤシ320mg/日**の摂取を検討します。

心血管系の健康

生活習慣病のリスク管理と心臓血管の健康維持のために、**オメガ3脂肪酸（EPA+DHA 1,000～2,000mg/日）、CoQ10 100～200mg/日、マグネシウム300～400mg/日**が推奨されます。

ストレス対策・活力向上

精神的な安定とエネルギー産生をサポートするため、**ビタミンB群（複合体）、亜鉛15～25mg/日、アシュワガンダ抽出物300～600mg/日**などが有効です。

季節・環境要因に応じたサプリメント戦略

患者様の生活環境や季節変動を詳細に考慮し、美容と健康維持を目的とした最適なサプリメント調整をご提案します。これにより、環境ストレスから肌と身体を効果的に保護し、より高いレベルの美容効果を追求します。

夏季対策：紫外線・汗ダメージからの保護

紫外線による酸化ダメージ対策としてアスタキサンチン (6-12mg/日)、ビタミンC (1000-2000mg/日)、ビタミンE (200-400IU/日)の積極的な摂取を推奨。また、多量の発汗に伴う電解質、亜鉛 (15-30mg/日)、マグネシウム (200-400mg/日)の損失に対し、適切な補給を提案します。特に夏場の肌荒れや疲労感の軽減に繋がります。

デスクワーク中心の方へ：眼精疲労と代謝改善

長時間のPC作業による眼精疲労には、ルテイン (10-20mg/日)とゼアキサンチン (2mg/日)、ブルーベリーエキスを組み合わせた摂取が有効です。運動不足による代謝低下やむくみには、脂肪燃焼を助けるL-カルニチン (500-1000mg/日)やα-リポ酸 (100-200mg/日)、エネルギー産生をサポートするCoQ10 (100-200mg/日)が推奨されます。




冬季対策：乾燥・免疫力低下への対応

日照時間減少によるビタミンD不足 (2000-4000IU/日)を補い、免疫力維持を図ります。乾燥肌対策として、ヒアルロン酸 (120-240mg/日)やセラミド (1.8mg/日以上)の経口摂取で肌のバリア機能を強化。風邪やインフルエンザ予防には、ビタミンC (1000-2000mg/日)とプロバイオティクス (乳酸菌・ビフィズス菌)の継続摂取が効果的です。

都市部居住者への推奨：環境汚染とストレスケア

大気汚染や排気ガスによる酸化ストレスを軽減するため、抗酸化ビタミン (A, C, E)、グルタチオン (100-300mg/日)、コエンザイムQ10 (100-200mg/日)を強化。精神的ストレス対策には、マグネシウム (200-400mg/日)、GABA (100-300mg/日)、テアニン (200mg/日)の摂取を推奨し、自律神経のバランスを整えます。



コンプライアンス向上のための工夫

サプリメントの効果を最大限に引き出すためには、患者様の継続的な服用が不可欠です。服薬遵守（コンプライアンス）を向上させるための具体的な工夫が重要になります。

1 シンプルな服用スケジュール

患者様の既存の生活習慣（例：歯磨き、食事）に紐付け、朝食後、夕食後、就寝前など具体的な服用タイミングを設定します。可能な限り1日1～2回で済むよう、サプリメントの組み合わせを最適化することで、飲み忘れを防ぎます。

2 効果の可視化と共有

服用開始前と定期的なビフォーアフター写真、肌水分量や体組成などの客観的な数値測定、あるいは専用アプリでの記録を推奨します。目に見える変化を患者様と共有することで、モチベーション維持と継続を促します。

3 段階的導入による負担軽減

一度に多種類のサプリメントを開始せず、まずは基本的なものから始め、効果や慣れに応じて徐々に追加していく方法を提案します。これにより、初期の心理的・経済的負担を軽減し、無理なく継続できる環境を整えます。



多職種連携の重要性

美容サプリメントの指導効果を最大化するためには、管理栄養士、薬剤師、看護師との密な連携が不可欠です。専門家と協力し、患者一人ひとりに最適なトータルサポートを提供します。

管理栄養士との連携

詳細な栄養アセスメントに基づき、食事からの栄養素摂取状況を把握。美容効果を高めるための具体的な食品例や調理法を提案し、サプリメントで補完すべき栄養素（例：ビタミンC、コラーゲンペプチドなど）を科学的に特定します。これにより、過不足のない最適な栄養計画を立案します。

薬剤師との連携

患者が服用している処方薬や他サプリメントとの相互作用を厳格にチェックします。市販サプリメントの成分についても確認し、患者の体質や既往歴に応じた適切な服薬指導を提供。必要に応じて、ドラッグストア等で入手可能な信頼できる製品の推奨も行い、患者の利便性と安全性を高めます。

看護師との連携

患者の長期的なフォローアップにおいて、サプリメントの効果や副作用を定期的に確認し、その情報を共有します。服薬遵守率（コンプライアンス）の評価や、患者からの疑問・不安の聞き取りを通じて、継続的なケアとサポートを行います。これにより、治療効果の最大化と患者満足度の向上に貢献します。

国内製品の上手な活用

日本の美容サプリメント市場では、国が定める制度に基づき、科学的根拠のある製品が流通しています。これらの制度を理解し、適切に活用することが重要です。

機能性表示食品

事業者の責任で、科学的根拠に基づいた機能性を表示できる食品です（例：肌のバリア機能維持、コラーゲン産生促進）。消費者庁への届出が必要で、美白や保湿効果などの訴求が可能です。



特定保健用食品（トクホ）

国が個別に審査を行い、健康への効果が科学的に証明された食品です。許可マークが付与され、消費者の信頼度が高く、長期使用の安心感につながります。



栄養機能食品

ビタミン・ミネラルなど、国の定める基準を満たした栄養成分を含む食品です。特定の栄養素の補給を目的とし、安全性は確立されており、手軽に基本的な栄養を補給できます。



海外製品・個人輸入への対応

患者から海外のサプリメントについて相談を受けた際は、専門家として成分表示や規制の違いを明確に説明し、必要に応じて摂取を控えるよう指導します。

海外製品の注意点

→ 成分濃度の違い

米国製品は日本より高濃度なものが多く、意図しない過剰摂取のリスクがあります。

→ 品質管理基準

製造国によって基準が異なり、重金属汚染や異物混入の報告例もあります。

→ 表示言語の誤解

外国語表示により、患者が成分や用法を誤解し、適切に摂取できない可能性があります。

→ 法的問題

日本では未承認の成分が含まれている場合があり、予期せぬ健康被害につながる可能性があります。

⊗ 個人輸入の指導ポイント

海外製品を希望する患者には、成分の安全性と必要性を十分に検討し、可能な限り国内製品での代替を提案します。具体的なリスクを説明し、患者が正確な情報を理解できるようサポートすることが重要です。



費用対効果の考慮

サプリメント療法は自由診療のため、患者様の経済的負担を考慮し、費用対効果を検討した上で最適な治療プランを提案することが重要です。

3-5

千円/月

基本的なビタミン・ミネラルサ
プリメント

10-20

千円/月

コラーゲン・美白系サプリメン
ト

30-50

千円/月

NMNなど高価格帯サプリメント

① 指導のポイント

患者様の経済状況を考慮し、まずは基本的で費用対効果の高いサプリメントから開始。効果を確認しながら高価格帯の製品を検討するアプローチが現実的です。また、食事で補える栄養素については、まず食事指導を優先しましょう。

副作用・有害事象のモニタリング

サプリメントは比較的安全性が高いとはいえ、副作用や有害事象が全くないわけではありません。患者の安全を確保するためには、適切なモニタリング体制の構築が医師の重要な責務です。



初期評価

サプリメント開始前に、肝機能、腎機能、血液検査などのベースライン値を確認します。アレルギー歴や服用中の薬剤についても詳細に聴取することが重要です。




定期フォローアップ

開始後1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月の時点で効果判定と安全性確認を実施します。特に複数のサプリメントを併用している場合は、注意深く患者の状態を観察します。





有害事象への対応

副作用が疑われる症状が出現した場合は、速やかにサプリメント中止を検討し、必要に応じて専門医への紹介や適切な医療的介入を行います。



今後の展望と新しい成分

美容サプリメント分野は日進月歩で発展しており、新しい成分や技術が次々と登場しています。医師として最新の動向を把握し、患者に最適な選択肢を提供することが求められます。



🧬 遺伝子解析ベース

個人の遺伝情報から肌質や体質を詳細に分析し、**最適な成分を配合したオーダーメイドサプリメント**の臨床応用が進んでいます。

☆ ナノテクノロジー

成分をナノレベルでカプセル化することで、吸収効率を最大化し、標的部位への到達率を飛躍的に向上させた次世代サプリメントが開発されています。

マイクروバイーム

個々人の腸内細菌叢を解析し、そのバランスに基づいて特定の菌株やプレバイオティクスを組み合わせる個別化プロバイオティクス療法が注目されています。

🧠 AI活用診断

AIが肌画像や問診データから**詳細な肌状態を診断**し、最適な美容サプリメントの組み合わせや用量を提案するシステムの実用化が進んでいます。

🌿 植物由来新成分

伝統医学で用いられてきた植物を科学的に検証し、**抗酸化や抗炎症作用を持つ新規成分**が発見され、その効果と安全性が確認されつつあります。

質の高いエビデンス構築に向けて

美容サプリメント分野において、より質の高いエビデンスの構築は急務です。医師として臨床研究への参加や、日常診療での詳細な記録を通じて、この分野の発展に貢献することができます。

症例記録の蓄積


日常診療における患者の反応や副作用について詳細な記録を蓄積し、安全性と有効性のデータベース構築に貢献します。

多施設共同研究

他の医療機関と連携し、より大規模で質の高い臨床研究を実施することで、エビデンスレベルの向上を図ります。

学会発表・論文化

得られた知見を学会発表や論文として公表し、美容医療コミュニティ全体の知識向上に寄与します。



患者教育と情報リテラシー向上

インターネット上には美容サプリメントに関する多くの情報が氾濫しており、患者が正確な情報を見分けることは困難です。医師として患者の情報リテラシー向上を支援することも重要な役割です。

信頼できる情報源の紹介

- 厚生労働省の「健康食品」に関する情報
- 消費者庁の機能性表示食品データベース
- 日本皮膚科学会などの専門学会ガイドライン
- 国立健康・栄養研究所の「健康食品」の安全性・有効性情報

注意すべき情報の特徴

- 「〇〇日で劇的変化」など過度に効果を謳うもの
- 科学的根拠が明示されていないもの
- 個人の体験談のみに基づく情報
- 販売目的が明確な情報サイト



① 患者への指導ポイント

「医師に相談せずにサプリメントを開始・変更しない」「複数の信頼できる情報源を確認する」「個人の体験談だけで判断しない」ことを指導します。

まとめ：美容医療におけるサプリメント活用の未来

美容医療におけるサプリメントとプロテインの活用は、患者のQOL向上に大きく寄与し得る一方で、**エビデンスに基づいた慎重なアプローチ**が求められます。医師は「栄養も含めて患者を診る」というホリスティックな視点を持ちながら、科学的根拠に裏付けられた製品・成分を選択し、他の美容施術とうまく組み合わせていくことが重要です。



エビデンスベースの実践

最新の文献をフォローし、**科学的根拠の質に応じた推奨度**を調整します。例えば、トラネキサム酸（TXA）は肝斑改善に、特定のプロバイオティクスはアトピー性皮膚炎の改善に有効性が確立されており、これらの**具体的な研究結果**を活用します。



個別化医療の実現

患者の年齢、性別、ライフスタイル、既往歴、そして**遺伝的素因（必要であれば遺伝子検査も考慮）**を総合的に評価し、**オーダーメイドのサプリメント計画**を提案します。一人ひとりに最適化されたケアを提供することで、最大の効果と安全性を追求します。



安全性の確保

国内外の**医薬品・サプリメント関連の安全情報**（例：相互作用、有害事象報告）を常に更新し、**副作用モニタリング体制**を構築します。特に、複数のサプリメント併用時や既存薬との**相互作用には十分注意**を払い、患者への詳細な説明を徹底します。



チーム医療の推進

栄養士、薬剤師、看護師、臨床検査技師との**多職種連携**により、栄養状態の評価、薬剤との相互作用チェック、生活習慣指導など、**多角的で継続的なケア**を実現します。患者を中心とした包括的なアプローチを展開し、QOL向上を目指します。

適切に用いれば、サプリメントとプロテインは美容医療の強力な武器となり、患者の内側から輝く健康美の実現に貢献できるでしょう。今後も科学の進歩とともに新しい成分や技術が登場することが予想されますが、常に患者の安全と利益を最優先に考え、質の高い美容医療の提供を目指していくことが我々医師の使命です。